

Cambie sus expectativas  
respecto del tratamiento  
para el cáncer de pulmón

AstraZeneca 

## TAGRISO ha demostrado ayudar a las personas a vivir significativamente más tiempo sin tumores creciendo o propagándose.

En función de los resultados de un estudio clínico, la mediana de tiempo fue de 18.9 meses con TAGRISSO y de 10.2 meses con otras terapias dirigidas al receptor del factor de crecimiento epidérmico (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR), erlotinib o gefitinib.

La mediana es el número intermedio en un grupo de números organizados del más bajo al más alto.

### ¿Qué es TAGRISSO?

TAGRISO es un medicamento recetado para el cáncer de pulmón de células no pequeñas (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) que se ha propagado a otras partes del cuerpo (metastásico). TAGRISSO se usa como primer tratamiento si los tumores tienen determinados genes anormales del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).

Su médico llevará a cabo una prueba para asegurarse de que TAGRISSO sea adecuado para usted. Se desconoce si TAGRISSO es seguro y eficaz en niños.

### Información de seguridad selectiva

TAGRISO puede causar efectos secundarios serios, incluidos **problemas pulmonares**.

TAGRISO puede ocasionar problemas pulmonares que podrían provocar la muerte. Los síntomas pueden ser similares a los síntomas del cáncer de pulmón. Informe a su médico de inmediato si tiene algún síntoma pulmonar nuevo o que empeore, como dificultad para respirar, falta de aire, tos o fiebre.

### Obtenga más información sobre TAGRISSO en la página 6

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el folleto y la Información de prescripción completa que se adjunta, incluida la Información para el paciente.



“Sepa que hay esperanza y opciones para usted”.  
– Rick

El diagnóstico de cáncer de pulmón puede ser preocupante. Tiene tantas cosas en la cabeza en ese momento y además recibirá mucha información nueva.

Cada persona con cáncer de pulmón tiene necesidades distintas. Encuentre la sección con la información que sea más útil para usted en este momento. Mantenga este folleto a mano para que pueda consultarlo cuando lo necesite.

### Lo que encontrará en este folleto:

- 04 Acerca del cáncer de pulmón
- 06 Acerca de TAGRISSO
- 10 Apoyo para usted y sus seres queridos
- 16 TAGRISSO como segundo tratamiento
- 20 Información de seguridad importante
- 22 Notas

# Entender sobre tipo de cáncer de pulmón

## Comencemos con los aspectos básicos

A medida que obtenga más información sobre su diagnóstico, oirá muchas palabras nuevas. **Estadio del cáncer** y **biomarcadores** son dos términos que es bueno conocer. Esto se debe a que pueden afectar las decisiones de tratamiento que usted y su médico toman juntos.



### Estadios del cáncer

Su médico llevará a cabo pruebas para determinar el estadio de su cáncer de pulmón. Existen 4 estadios principales de cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC). A menudo, se describen con números romanos (**estadio I, estadio II, estadio III y estadio IV**). Mientras más bajo sea el número, menos se ha propagado el cáncer.



### Biomarcadores

A veces, los análisis de biomarcadores se refieren a análisis genéticos, análisis moleculares o pruebas de mutación. Ayudan a su médico a comprender su tipo de cáncer y el tratamiento que puede funcionar mejor para retrasar o detener el crecimiento del cáncer.

Su cáncer puede ser analizado para estos biomarcadores comunes de NSCLC:

EGFR

ALK

PD-L1

BRAF

ROS1

**Los análisis de biomarcadores son importantes** porque le ayudarán a usted y a su médico a determinar qué tratamiento es el adecuado.

## Cómo encontrar un tratamiento diseñado para su cáncer de pulmón

Conocer el estadio y el biomarcador podría significar la obtención de un tratamiento que esté específicamente diseñado para su tipo de cáncer.

### El EGFR es uno de los biomarcadores más importantes del NSCLC

Por sus siglas en inglés, EGFR significa receptor del factor de crecimiento epidérmico. Si el análisis de cáncer es positivo respecto a una mutación del EGFR, usted podría comenzar a tomar TAGRISSO, una pastilla que se toma una vez al día que está diseñada específicamente para atacar determinados tipos de genes anormales del EGFR.

Asegúrese de preguntar a su médico si su cáncer de pulmón se analizó respecto del biomarcador EGFR.

*“La información que puede obtener de los análisis realmente vale la pena”. – Ivy*

### Información de seguridad selectiva

TAGRISSO puede causar efectos secundarios serios, incluidos **problemas cardíacos e insuficiencia cardíaca**.

TAGRISSO puede ocasionar problemas cardíacos que podrían provocar la muerte. Su médico debe verificar su función cardíaca antes de que comience a tomar TAGRISSO y durante el tratamiento, según sea necesario. Notifique de inmediato a su médico si tiene alguno de los siguientes signos y síntomas de un problema cardíaco: sensación de que su corazón está latiendo fuerte o muy rápido, falta de aire, hinchazón de los tobillos y pies, sensación de aturdimiento.

**Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el folleto y la Información de prescripción completa que se adjunta, incluida la Información para el paciente.**



## La terapia dirigida está diseñada para tratar un tipo de cáncer específico

### Las terapias dirigidas hacen justamente lo que usted cree que harían

Una terapia dirigida es un tratamiento que se focaliza en un tipo de cáncer específico. Estas terapias funcionan bloqueando la señal que causa que las células cancerosas crezcan y se propaguen.

TAGRISO es un tipo de terapia dirigida que se denomina inhibidor de la tirosina quinasa (Tyrosine Kinase Inhibitor, TKI). Este tipo de terapia detiene una actividad específica en las células e impide que crezcan y se propaguen.

*“Tuve mucha suerte de que mi tumor fuera EGFR positivo. Significaba que podía recibir terapia dirigida”. – Denny*



### TAGRISO se focaliza en el cáncer de pulmón EGFR+

TAGRISO está aprobado para tratar a personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico con determinados tipos de genes anormales del EGFR.

El EGFR se encuentra en la superficie de algunas células, incluidas células sanas. TAGRISO ataca determinados tipos de genes anormales del EGFR y puede retrasar el crecimiento de las células cancerosas para que no se propaguen a otras partes del cuerpo.

#### Pastilla conveniente que se toma una vez al día

Tomar TAGRISO puede adaptarse convenientemente a su rutina diaria.



Una pastilla, una vez al día



A cualquier hora del día



Con o sin comida

#### Información de seguridad selectiva

TAGRISO puede causar efectos secundarios serios, incluidos **problemas oculares**.

Notifique de inmediato a su médico si tiene algún síntoma de problemas en los ojos, que pueden incluir ojos llorosos, sensibilidad a la luz, dolor en los ojos, ojos rojos o cambios en la visión. Su médico puede derivarlo a que consulte con un especialista de ojos (oftalmólogo) si presenta problemas en los ojos con TAGRISO.

Consulte la **Información de seguridad importante adicional en todo el folleto y la Información de prescripción completa que se adjunta, incluida la Información para el paciente.**



# Sepa qué es posible con TAGRISSO

## Progreso importante en el tratamiento para el cáncer de pulmón

En un estudio clínico reciente, TAGRISSO mostró resultados nunca antes vistos para el cáncer de pulmón de células no pequeñas EGFR+.

Las personas que tomaron TAGRISSO vivieron sin que los tumores crecieran o se propagaran durante una mediana de tiempo de 18.9 meses en comparación con 10.2 meses en el caso de personas que tomaron erlotinib o gefitinib, que también son terapias dirigidas al EGFR.

La mediana es el número intermedio en un grupo de números organizados del más bajo al más alto.

Las personas vivieron casi el doble de tiempo sin que los tumores crecieran o se propagaran

*“Es un momento emocionante. Hay mucha más esperanza en el horizonte”. – Dan*

## Acerca del ensayo clínico

Los ensayos clínicos son una herramienta de investigación importante. Pueden ayudar a los médicos a evaluar si un fármaco es seguro y eficaz.

A veces, en un ensayo clínico, un tratamiento se comparará con otro tratamiento diferente. Esto se denomina “estudio comparativo directo” y eso es lo que se hizo en el ensayo clínico reciente de TAGRISSO. TAGRISSO se comparó con erlotinib o gefitinib, que son otras terapias dirigidas al EGFR.

**El 77 % de las personas que tomaron TAGRISSO experimentaron una reducción de sus tumores**



## Información de seguridad selectiva

Informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas y cualquier medicamento que tome, y si está o planea quedar embarazada o está amamantando. Los efectos secundarios más frecuentes de TAGRISSO son diarrea, sarpullido, piel seca, cambios en las uñas, molestias en la boca, cansancio y disminución del apetito.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el folleto y la Información de prescripción completa que se adjunta, incluida la Información para el paciente.

## Resultados: Cuando el cáncer se propagó al cerebro

41 personas que tenían tumores propagados al cerebro antes del estudio fueron evaluadas para ver de qué forma TAGRISSO afectó sus tumores cerebrales. El estudio reveló lo siguiente:

- El 77 % de las personas que tomaron TAGRISSO experimentaron una reducción de sus tumores cerebrales. El 18 % experimentó una desaparición completa de sus tumores cerebrales.
- El 63 % de las personas que recibieron tratamiento con otras terapias dirigidas al EGFR, erlotinib o gefitinib, experimentaron reducción de sus tumores cerebrales. Ninguna persona experimentó una desaparición completa de sus tumores.

# Maneras de cuidarse

## Céntrese en su propio bienestar

Es posible que experimente algunos altibajos emocionales después del diagnóstico. Estas son algunas cosas que puede hacer en este momento.



### Haga que sea un esfuerzo en equipo

Comparta con su médico cómo se siente respecto del tratamiento.



### Reconozca sus emociones

Posiblemente no siempre se sienta optimista y está bien. Sus emociones son suyas.



### Haga cosas que disfruta

Participe en pasatiempos y actividades que le hagan sentirse bien.



### No dude en hacer preguntas

Ninguna pregunta es demasiado insignificante o crucial. Si no entiende algo, pida a su médico o a alguien de su equipo de tratamiento que se lo explique.



### Pida ayuda

Lleve a un ser querido a las citas o pida ayuda con las tareas del hogar.



## Cómo hablar de su cáncer de pulmón con amigos y familiares

Podría ser difícil iniciar una conversación cuando se trata de su diagnóstico. Sus seres queridos se preocupan por usted y desean saber cómo está. Estas son algunas ideas prácticas sobre cómo abordar el tema.

### Decida a quién desea contarle sobre su diagnóstico

Haga una lista de las personas que forman parte de su vida que quisiera que sepan sobre su salud.

### Sea específico

Puede decir cosas como las siguientes:

- “Me entristece compartir esta noticia con ustedes, pero quería contarles que me diagnosticaron cáncer de pulmón de células no pequeñas”.
- “Mi médico me recetó una pastilla que se focaliza específicamente en el tipo de cáncer de pulmón que tengo”.

### Comparta solo aquello con lo que se siente cómodo

Posiblemente note que no se siente cómodo hablando de ciertas cosas en este momento. Si sale a la luz algo de lo que no quiere hablar, puede cambiar la conversación al decir: “Gracias por preguntar por mí, pero hoy preferiría enfocarme en otra cosa”.

### Aliente a sus seres queridos a obtener más información por su propia cuenta

Si las personas desean más información, diríjelas a organizaciones de lucha contra el cáncer de pulmón como LUNgevity en [lungevity.org](http://lungevity.org) o Lung Cancer Alliance en [lungcanceralliance.org](http://lungcanceralliance.org).

# Cuando su ser querido tiene cáncer de pulmón

## Cómo ayudar a su ser querido

Cuando un ser querido tiene cáncer de pulmón, todos podrían sentirse muy emocionales. Usted querrá hacer todo lo que pueda. Estas son algunas sugerencias que podrían ser útiles a ambos.



### Aprenda sobre la enfermedad y el tratamiento

Al ofrecer ayuda con la investigación, no solo mostrará que le importa, sino que también ayudará a quitarle una carga a su ser querido.



### Súmese a su ser querido en las visitas al médico

Usted puede ser un segundo par de oídos, anotar información y hacer preguntas también.



### Ofrezca ayuda

Realizar los quehaceres, las compras y otras tareas puede realmente facilitar las cosas para alguien que padece cáncer de pulmón.



### Incluya a su ser querido en actividades

Hacer cosas juntos puede proporcionar una sensación de normalidad y ayudarlos a ambos a mantenerse conectados.



### Celebre los acontecimientos importantes

Tómese tiempo para reconocer y celebrar los éxitos y logros. Esto puede tener un impacto positivo en la sensación de bienestar de su ser querido.

## Usted también necesita apoyo

Usted es una gran parte de la vida de su ser querido y es importante que también se sienta respaldado.



### Tómese tiempo para usted

Tomarse descansos cortos y hacer las cosas que le gustan puede ayudarlo a ser un apoyo positivo para su ser querido. Coma bien, haga ejercicio cuando pueda y duerma. Su bienestar emocional y físico es clave para brindar apoyo a su ser querido.



### Únase a un grupo de apoyo

Hablar con personas que comprenden lo que está experimentando puede ser positivo. Busque un grupo de apoyo en su área y conéctese con la comunidad de TAGRISSO en Facebook en [facebook.com/TAGRISSO](https://www.facebook.com/TAGRISSO).

## Información de seguridad selectiva

Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le molesta o que no desaparece.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el folleto y la Información de prescripción completa que se adjunta, incluida la Información para el paciente.



## AstraZeneca Access 360™

El programa AstraZeneca Access 360™ puede ayudarle a tener acceso a la atención que necesita y responder sus preguntas.

### Maneras en que podemos ayudar

» Cobertura de seguro, costos en efectivo y opciones de farmacias que abastecen o entregan sus medicamentos

» Apoyo financiero

» Ayuda de enfermería y otra ayuda educativa



Ayuda para acceder a los medicamentos que necesita

Para obtener más información sobre el programa AstraZeneca Access 360™, llame al

**1-844-ASK-A360**  
(1-844-275-2360)

de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este,

o visite nuestro sitio web  
[MyAccess360.com](http://MyAccess360.com)

Si no tiene cobertura de medicamentos recetados o no puede pagar los medicamentos, AstraZeneca podría ayudarle.





## Cuando el cáncer de pulmón cambia

Si padece cáncer de pulmón de células no pequeñas EGFR+ metastásico, es posible que ya reciba una terapia dirigida que se denomina inhibidor de la tirosina quinasa (TKI).

### ¿Pero qué sucede cuando el tratamiento deja de funcionar?

La progresión del cáncer es diferente en cada persona. Si esto ocurre, no significa que su tratamiento inicial con TKI no fue adecuado. Significa que las células cancerosas encontraron la manera de desarrollarse a pesar del tratamiento. Cuando el cáncer de pulmón EGFR+ avanza, a menudo, se debe a una nueva mutación.

Es por eso que es tan importante trabajar de cerca con su médico para saber cuáles serán los pasos a seguir si su cáncer de pulmón cambia. De esa manera, contará con un plan y estará preparado para tomar decisiones, llegado el momento.

“Cuando mi resultado dio positivo, tuve una sensación de alivio”. – Rick



### ¿Qué es TAGRISSO?

TAGRISSO es un medicamento recetado para el cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) que se ha propagado a otras partes del cuerpo (metastásico).

TAGRISSO se usa para determinado tipo de gen del EGFR que se trató con un medicamento inhibidor de la tirosina quinasa (TKI) del

EGFR que no funcionó o ya no funciona.

Su médico llevará a cabo una prueba para asegurarse de que TAGRISSO sea adecuado para usted.

Se desconoce si TAGRISSO es seguro y eficaz en niños.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el folleto y la Información de prescripción completa que se adjunta, incluida la Información para el paciente.

 **TAGRISSO**<sup>®</sup>  
osimertinib

# TAGRISO puede ser una opción si su primer tratamiento deja de funcionar

TAGRISO puede ayudarle a vivir significativamente más tiempo sin tumores creciendo o propagándose\*

TAGRISO también se analizó en un estudio clínico separado con personas que tenían **cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) metastásico** que ya habían recibido tratamiento y luego presentaron una segunda mutación.

Si tiene NSCLC EGFR+ metastásico que actualmente es tratado:

- Puede estar recibiendo un tipo de tratamiento dirigido que se conoce como inhibidor de la tirosina quinasa (TKI).
- Si el cáncer cambia y el tratamiento deja de funcionar, TAGRISO podría ser adecuado para usted.

TAGRISO aumentó en un 70 % la posibilidad de vivir sin tumores en crecimiento o propagándose, en comparación con la quimioterapia.

\* En el estudio clínico, 279 personas tomaron TAGRISO y 140 personas recibieron quimioterapia. La mediana de tiempo que las personas vivieron sin tumores en crecimiento o propagándose fue de 10.1 meses para quienes recibían TAGRISO y 4.4 meses para quienes recibían quimioterapia.


La mediana es el número intermedio en un grupo de números organizados del más bajo al más alto.

Pregunte a su médico sobre TAGRISO a fin de que pueda estar preparado para los próximos pasos.

TAGRISO ha demostrado ayudar a reducir los tumores

Más de 6 de cada 10 personas que tomaron TAGRISO experimentaron una reducción de sus tumores en comparación con 3 de cada 10 personas que recibieron quimioterapia†.

Más de 6 de cada 10 personas vieron resultados



† El 65 % de las personas que tomaron TAGRISO en comparación con el 29 % de las personas que recibieron quimioterapia.

## Información de seguridad selectiva

TAGRISO puede causar efectos secundarios serios, incluidos **problemas pulmonares**.

TAGRISO puede ocasionar problemas pulmonares que podrían provocar la muerte. Los síntomas pueden ser similares a los síntomas del cáncer de pulmón. Informe a su médico de inmediato si tiene algún síntoma pulmonar nuevo o que empeore, como dificultad para respirar, falta de aire, tos o fiebre.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el folleto y la Información de prescripción completa que se adjunta, incluida la Información para el paciente.

## TAGRISO y los tumores en el cerebro

46 personas que tenían tumores propagados al cerebro antes del estudio fueron evaluadas para ver de qué forma TAGRISO afectó sus tumores cerebrales:

El 57 % de quienes tomaron TAGRISO y el 25 % de quienes recibieron quimioterapia presentaron una reducción de sus tumores cerebrales.

## Indicaciones e información de seguridad importante de TAGRISSO

### ¿Qué es TAGRISSO?

TAGRISSO es un medicamento recetado para el cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) que se ha propagado a otras partes del cuerpo (metastásico). TAGRISSO se usa de la siguiente manera:

- Como primer tratamiento si los tumores tienen determinados genes anormales del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR),  
o bien,
- para determinado tipo de gen del EGFR que se trató con un medicamento inhibidor de la tirosina quinasa (TKI) del EGFR que no funcionó o ya no funciona.

Su médico llevará a cabo una prueba para asegurarse de que TAGRISSO sea adecuado para usted.

Se desconoce si TAGRISSO es seguro y eficaz en niños.

### Información de seguridad importante

**TAGRISSO puede causar efectos secundarios serios, entre ellos:**

- **Problemas pulmonares.** TAGRISSO puede ocasionar problemas pulmonares que podrían provocar la muerte. Los

síntomas pueden ser similares a los síntomas del cáncer de pulmón. Informe a su médico de inmediato si tiene algún síntoma pulmonar nuevo o que empeore, como dificultad para respirar, falta de aire, tos o fiebre.

- **Problemas cardíacos, como insuficiencia cardíaca.** TAGRISSO puede ocasionar problemas cardíacos que podrían provocar la muerte. Su médico debe verificar su función cardíaca antes de que comience a tomar TAGRISSO y durante el tratamiento, según sea necesario. Notifique de inmediato a su médico si tiene alguno de los siguientes signos y síntomas de un problema cardíaco: sensación de que su corazón está latiendo fuerte o muy rápido, falta de aire, hinchazón de los tobillos y pies, sensación de aturdimiento.
- **Problemas oculares.** TAGRISSO puede causar problemas en los ojos. Notifique de inmediato a su médico si tiene algún síntoma de problemas en los ojos, que pueden incluir ojos llorosos, sensibilidad a la luz, dolor en los ojos, ojos rojos o cambios en la visión. Su médico puede referirle a un especialista de ojos

(oftalmólogo) si presenta problemas en los ojos con TAGRISSO.

**Antes de tomar TAGRISSO, informe a su médico acerca de todas sus condiciones médicas, incluso si usted:**

- Tiene problemas pulmonares o respiratorios.
- Tiene problemas cardíacos, incluida una afección llamada síndrome del intervalo QTc prolongado.
- Tiene problemas con los electrolitos, como sodio, potasio, calcio o magnesio.
- Tiene antecedentes de problemas oculares.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. TAGRISSO puede causar daños a su bebé en gestación. Informe de inmediato a su médico si está embarazada o cree que podría estarlo durante el tratamiento con TAGRISSO.
- **Las mujeres** que puedan quedar embarazadas deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con TAGRISSO y durante 6 semanas después de la última dosis de TAGRISSO.

- **Los hombres** cuyas parejas puedan quedar embarazadas deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con TAGRISSO y durante 4 meses después de la última dosis de TAGRISSO.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si TAGRISSO pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con TAGRISSO y por 2 semanas después de la dosis final de TAGRISSO. Hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante este tiempo.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas o los suplementos a base de hierbas. En particular, informe a su médico si toma algún medicamento para el corazón o la presión arterial.

**Los efectos secundarios más frecuentes de TAGRISSO son los siguientes:**

- Diarrea.
- Erupción.
- Piel seca.

- Cambios en las uñas, que incluyen enrojecimiento, sensibilidad, dolor, inflamación, fragilidad, desprendimiento del lecho ungueal y descamación de las uñas.
- Molestias en la boca.
- Cansancio.
- Disminución del apetito.

Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le molesta o que no desaparece.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de TAGRISSO. Para obtener más información, pregunte a su médico o farmacéutico.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Puede informar efectos secundarios a la Administración de drogas y alimentos (Food and Drug Administration, FDA) llamando al 1-800-FDA-1088.

**Lea la Información de prescripción completa que se adjunta, incluida la Información para el paciente.**



Cuando esté en el consultorio del médico, anote cualquier pregunta que pueda surgir.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




Conéctese con la



comunidad de Facebook

Busque apoyo, comparta su propia experiencia e interactúe con personas como usted que padecen cáncer de pulmón.

» Únase hoy en 

[facebook.com/TAGRISSO](https://facebook.com/TAGRISSO)

Para obtener más información, visite [TAGRISSO.com](https://TAGRISSO.com)

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el folleto y la Información de prescripción completa que se adjunta, incluida la Información para el paciente.

## ¿Qué es TAGRISSO?

TAGRISSO es un medicamento recetado para el cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) que se ha propagado a otras partes del cuerpo (metastásico). TAGRISSO se usa de la siguiente manera:

- Como primer tratamiento si los tumores tienen determinados genes anormales del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), **o bien,**
- para determinado tipo de gen del EGFR que se trató con un medicamento inhibidor de la tirosina quinasa (TKI) del EGFR que no funcionó o ya no funciona.

Imágenes utilizadas solo con fines ilustrativos.

TAGRISSO es una marca comercial registrada del grupo de compañías AstraZeneca.

AstraZeneca Access 360 es una marca comercial del grupo de empresas AstraZeneca.

©2018 AstraZeneca. Todos los derechos reservados. US-21767 8/18

Su médico llevará a cabo una prueba para asegurarse de que TAGRISSO sea adecuado para usted. Se desconoce si TAGRISSO es seguro y eficaz en niños.

## Información de seguridad selectiva

TAGRISSO puede causar efectos secundarios serios, incluidos **problemas cardíacos e insuficiencia cardíaca**.

TAGRISSO puede ocasionar problemas cardíacos que podrían provocar la muerte. Su médico debe verificar su función cardíaca antes de que comience a tomar TAGRISSO y durante el tratamiento, según sea necesario. Notifique de inmediato a su médico si tiene alguno de los siguientes signos y síntomas de un problema cardíaco: sensación de que su corazón está latiendo fuerte o muy rápido, falta de aire, hinchazón de los tobillos y pies, sensación de aturdimiento.

 AstraZeneca